


## 5.6 Repetition

### Del 1 – Med digitala hjälpmedel – Endast svar krävs

D1. Figuren till höger visar grafen till en funktion,  $f$ , som är definierad i intervallet  $0 \leq x \leq 6$

Använd grafen för att svara på frågorna nedan.



a) Bestäm värdet av  $\int_0^3 f(x) dx$

Svar: \_\_\_\_\_ (1/0/0)


b) Vilket positivt värde på  $a$  löser ekvationen  $\int_0^a f(x) dx = 0$

Svar: \_\_\_\_\_ (1/0/0)

D2. a) Rita i det tomma koordinatsystemet till höger ut det område som kan beskrivas av integralen

$$\int_1^4 (2 - x) dx$$


(1/0/0)



b) Bestäm värdet av integralen i a)-uppgiften.

Svar: \_\_\_\_\_ (1/0/0)

- D3. Figuren till höger visar grafen till en funktion,  $g$ , som är definerad i intervallet  $0 \leq x \leq 9$




Bestäm **största** värdet av integralen

$$\int_0^a g(x) dx$$

Svar: \_\_\_\_\_ (0/1/0)

- D4. Grafen till höger visar en normalfördelningskurva med standardavvikelsen 0,7.


Bestäm arean av det markerade området.



Svar: \_\_\_\_\_ (0/1/0)

- D5. Figuren till höger visar de två funktionerna  $f$  och  $g$  och ett område mellan dessa.

Områdets area är  $23ae$  och  $\int_2^6 f(x) dx = 10$




Bestäm värdet av  $\int_2^6 f(x) dx + \int_2^6 g(x) dx$

Svar: \_\_\_\_\_ (0/1/0)

D6. Uppgiften nedan är ifrån ett gammalt nationellt prov. Lös uppgiften.

Figuren visar grafen till funktionen  $f$



Vilket av alternativen A-E ger den sammanlagda arean av de områden som markerats i figuren?

A.  $\int_a^c f(x) dx$

B.  $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$

C.  $-\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$

D.  $-\int_a^0 f(x) dx + \int_0^c f(x) dx$

E.  $-\int_a^b f(x) dx - \int_b^0 f(x) dx + \int_0^c f(x) dx$

Svar: \_\_\_\_\_

(0/1/0)

D7. Ange en valfri linjär funktion  $f$  som uppfyller


$$\int_1^3 f(x) dx = -10$$

Svar: \_\_\_\_\_

(0/1/0)

- D8. Figuren visar grafen till en trigonometrisk funktion på formen  $f(x) = A\cos(kx)$  och ett markerat område.

Arean av området är 15 ae.



a) Bestäm  $\int_0^{21} f(x) dx$

Svar: \_\_\_\_\_ (0/1/0)

b) Bestäm  $\int_0^{21} |f(x)| dx$


Svar: \_\_\_\_\_ (0/1/0)

- c) Bestäm värdet av konstanten  $A$ . Svara exakt!

Svar: \_\_\_\_\_ (0/0/1)

- D9. Figuren visar grafen till en funktion,  $f$  som består av en horisontell rät linje och en kvartscirkel.

Bestäm värdet av  $\int_0^6 \pi \cdot f(x)^2 dx$



Svar: \_\_\_\_\_ (0/0/1)

**Del 2 – Med digitala hjälpmedel – Uträkningar krävs**


D10. Figuren visar ett område som begränsas av funktionerna

$$f(x) = 1,6^x \text{ och } g(x) = 2,3x - 2 \text{ samt } y\text{-axeln}$$

Bestäm arean av området.

Svara med 2 decimalers noggrannhet!

(2/0/0)



D11. Figuren visar ett område som begränsas av funktionerna


$$f(x) = \sqrt{4 - x^2} \text{ och } x = 1 \text{ samt } y\text{-axeln}$$

Om området roteras kring  $x$ -axeln fås en rotations kropp.

Bestäm volymen av denna rotations kropp

Svara med 2 decimalers noggrannhet!


(2/0/0)



- D12. En matematiklärare provar en ny diet under en vecka. Viktförändringen  $V'$  beskrivs under veckan av funktionen  $V'(x) = -0,3 (\cos(0,3x - 0,2))^3 + 0,024$  där  $x$  är antal dagar som gått av veckan,  $0 \leq x \leq 7$

Med hur många kg förändrades lärarens vikt av dietveckan?

(1/1/0)




- D13. Figuren nedan visar graferna till  $f(x) = 1,2\sin(1,5x)$  och  $g(x) = x^2 - 1,5$ , och ett markerat område.

Bestäm arean av detta område.

(2/1/0)

Svara med 3 decimaler!



D14. Bestäm värdet av  $\int_0^6 |5x - 10| dx$

(0/2/0)

D15. Nedanstående uppgift är ifrån ett gammalt nationellt prov. Lös uppgiften.

(1/1/0)

Ett område begränsas av kurvorna  $y = e^{0,2x}$  och  $y = 6x - x^2 + 1$

Teckna ett integraluttryck för arean av detta område och bestäm ett närmevärde till denna area med minst 3 värdesiffror.

D16. Uppgiften nedan är ifrån ett gammalt nationellt prov. Lös uppgiften.

Antalet bin i ett bisamhälle efter  $t$  veckor betecknas  $n(t)$ . Från början är

antalet bin 5000. Biodlaren tecknar uttrycket  $5000 + \int_0^{15} n'(t) dt$

a) Vad betyder den andra termen i uttrycket? (0/1)

b) Vad betyder hela uttrycket? (0/1)

D17. Sannolikheten för att komma fram till en viss myndighets telefonsupport efter  $x$  minuters väntan ges av täthetsfunktionen

$$f(x) = \frac{1}{6} e^{-\frac{x}{6}}$$

a) Hur stor är sannolikheten att få prata med supporten inom 5 minuter? (0/2/0)

b) Hur många minuter har det gått innan 60 % har kommit fram till supporten? (0/2/0)

D18. En elev, som tycker det är jobbigt att integraler kan ge negativa "areavärden", medan riktiga areor mellan  $x$ -axeln och en funktionsgraf alltid är positiva, föreslår en metod som alltid ger arean mellan  $x$ -axeln och funktionsgrafen, oavsett om funktionen är över eller under  $x$ -axeln.

- "Om du istället för att ta integralen av funktionen istället tar integralen av dess **absolutbelopp**, kommer svaret alltid motsvara arean som täcks in mellan funktionen och  $x$ -axeln"

Har eleven rätt?

(0/2/0)

Motivera ditt svar!

D19. Bestäm det värde på  $a$  som löser ekvationen

(0/2/0)

$$\int_0^a e^{x-1} dx = \int_0^a (x^3 - \sqrt{x}) dx$$

Svara med 2 decimaler!

D20. Uppgiften nedan är ifrån ett gammalt nationellt prov. Lös uppgiften.

(0/2/0)

De styrande i ett land är osäkra på befolkningsutvecklingen i landet. De anlitar två olika konsulter för att de ska göra var sin prognos över befolkningsutvecklingen de kommande åren.

Den första konsulten anser att folkmängden kommer att växa med hastigheten  $100e^{0,02t}$  tusen personer per år.

Den andra konsulten anser att folkmängden kommer att växa med hastigheten  $100 + 0,2t + 0,02t^2$  tusen personer per år.

I båda prognoserna är  $t$  tiden i år räknat från början av år 2000.

Prognoserna ger olika besked om hur mycket befolkningen kommer att öka. Hur stor är skillnaden i folkmängd mellan de båda prognoserna i början av år 2015?

D21. Nedanstående uppgift är ifrån ett gammalt nationellt prov. Lös uppgiften.

(0/2/0)

Om man vill beräkna längden  $L$  av en kurva  $y = f(x)$  mellan två punkter vars  $x$ -koordinater är  $a$  och  $b$  kan man använda formeln

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Beräkna längden av kurvan  $y = \left(x - \frac{4}{9}\right)^{\frac{3}{2}}$  i intervallet  $1 \leq x \leq 4$

D22. Enligt en studie gjord av en elev som gjorde ett gymnasiearbete om uttrar så är vikten hos populationen uttrar i Norrforsen normalfördelad med medelvärdet 9 kg och standardavvikelsen 0,7 kg.

Antag att två helt slumpartat valda uttrar fångas in för vägning.

Hur stor är sannolikheten att BÅDA dessa uttrar väger mindre än 8 kg?

(0/2/0)

D23. Figuren till höger visar grafen till funktionen  $f(x) = 0,6^x - 0,4$  och det område som begränsas av de positiva koordinataxlarna och grafen.


Om området roteras kring  $x$ -axeln fås en rotationskropp.

Om området istället roteras kring  $y$ -axeln fås en annan rotationskropp.

Undersök vilken av dessa båda rotationskropparna som har störst volym, samt ta reda på volymskillnaden.

Svara med 2 decimalers noggrannhet!


(0/4/0)



D24. Uppgiften nedan är ifrån ett gammalt nationellt prov. Lös uppgiften.

En från början tom tank fylls med vatten. I bilden nedan visas hur påfyllningshastigheten  $y$  liter/min beror av tiden  $x$  min. På grund av minskat vattentryck sjönk hastigheten under en tiominutersperiod. Under denna period kan påfyllnings-

hastigheten beskrivas med funktionen  $y = \frac{1000}{x} - 20$



- a) Teckna ett uttryck för volymen vatten i tanken efter 30 min och beräkna värdet. (0/2)
- b) Efter hur lång tid är volymen vatten i tanken 1000 liter? (0/2)

D25. Bestäm värdet av  $\int_0^{\pi/3} (2 \sin(x) + 2) \cdot \cos(x) dx$   
Svara exakt (prova att göra uppgiften utan CAS-läge)!


(0/0/2)

D26. Nedanstående uppgift är ifrån ett gammalt Mattias-prov. Lös uppgiften.

En konstnär vill tillverka ett glaskonstverk föreställande en jättestor hamburgare.

Konstnären tänker sig att hamburgerbrödet utgörs av två *klotsegment* med mått enligt den vänstra figuren, och att köttbiten ska utgöras av en symmetriskt mittensegment enligt figuren till höger.

För fulländad estetik tänker sig konstnären att köttet ska ha samma volym som **hela brödet**.




Hjälp konstnären att bestämma tjockleken på köttet,  $t$ .

(0/1/3)

D27. Grafen till funktionen  $y = \sin(x)$  i intervallet  $0 \leq x \leq \pi$  begränsar tillsammans med  $x$ -axeln ett område.

Detta område kan delas i två lika stora delar med hjälp av en rät linje som går igenom origo.

Linjen skär grafen i en punkt, **P**. Se figur.



Bestäm  $x$ -koordinaten hos **P**.  
Svara med 3 decimaler!

(0/0/3)

D28. En designer vill bygga en fontän av cement.  
Som grund används en rotationskropp.


Området som ska roteras visas nedan och  
det begränsas av funktionerna



$$y = 2,3$$

$$x = 1,2$$

samt den del av  $\frac{y^4}{15} + \sqrt{x} = 1$  som ligger i första kvadranten



Hur mycket cement krävs för att bygga  
fontänen om alla mått anges i m?

(0/1/3)